

## 胆道がん

レジメン名	薬剤名	基準投与量	基準投与日	1クール
GEM/CDDP	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	day1,8 day1,8	21日
GCS	シスプラチン ゲムシタピン エスワンタイホウ配合OD錠T	25mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /日	day1 day1 day1-7	14日
weekly GEM 3投1休	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日
GEM/S1	ゲムシタピン エスワンタイホウ配合OD錠T	1000mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /日	day1,8 ※1	21日
GEM/S1	ゲムシタピン エスワンタイホウ配合OD錠T	400mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /日	day1,8,15 ※1	28日
S1	エスワンタイホウ配合OD錠T	80mg/m <sup>2</sup> /日	※1	
イミフィンジ+GEM/CDDP	イミフィンジ シスプラチン ゲムシタピン	1500mg/body 25mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8 day1,8	21日
維持療法 イミフィンジ	イミフィンジ	1500mg/body	day1	28日
キイトルーダ <sup>®</sup> +GEM/CDDP	キイトルーダ <sup>®</sup> シスプラチン ゲムシタピン	200mg/body 25mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	day1 day1,8 day1,8	21日

※1:エスワンタイホウ配合OD錠Tの投与方法

患者の状態により投与スケジュールを①4週2休/6週 ②2週1休/3週 ③隔日投与 ④週4(月水金日) ⑤週4(火木土日)  
⑥5投2休/7日 に適宜調整